

Semiología cortical de la circulación anterior

ICTUS DE LA ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR

- 1) Hemiparesia y hemihipoestesia, de predominio crural, contralateral a la lesión.
- 2) Incontinencia urinaria.
- 3) Pérdida del interés por el entorno y cambios de personalidad, incluso mutismo pseudofuncional.
- 4) Agrafía.
- 5) Si la lesión es **izquierda** puede existir afasia.

ICTUS DE LA ARTERIA CEREBRAL MEDIA

Síntomas comunes a ambos hemisferios

- 1) Hemiplejía y hemihipoestesia, de predominio braquial, contrario al lado de la lesión.
- 2) Desviación comisura de los labios y de los ojos al lado contrario de la hemiplejía.
- 3) Babinski del lado de la hemiplejía.
- 4) Hemianopsia homónima del mismo lado que la hemiplejía.
- 5) Heminatención del mismo lado que la hemiplejía.
- 6) Buen nivel de consciencia en las primeras horas.

Síntomas de la arteria cerebral media derecha:

- 1) Anosognosia.
- 2) Asomatognosia.
- 3) Extinción sensorial.
- 4) Negligencia visuoespacial.
- 5) Apraxia de construcción y de vestir.
- 6) Apraxia de la apertura ocular (en el infarto completo los pacientes se pueden mostrar con los ojos cerrados, aparentando un bajo nivel de consciencia debido a esta alteración).
- 7) Desorientación temporal.

Síntomas de la arteria cerebral media izquierda:

- 1) Afasia.